



Nombre y apellidos del/la paciente:
Edad:
CIP:
DNI:
Nº HC:
Fecha de ingreso:

## ÍNDICE DE ROCKALL PARA LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Parámetro	Valor	Puntos	Puntuación
Edad	< 60	0	
	60-79	1	
	≥ 80	2	
Shock	No	0	
	FC > 100 lpm	1	
	TAS < 100 mm Hg	2	
Comorbilidad	No	0	
	ICC, Cardiopatía isquémica, cualquier comorbilidad severa	2	
	IRC, hepatopatía, neoplasia diseminada	3	
Puntuación inicial (antes de la endoscopia). Máximo 7			
Diagnóstico	Mallory-Weiss, sin lesiones ni estigmas	0	
	Otros diagnósticos	1	
	Neoplasia digestiva alta	2	
Estigmas hemostasia	Base limpia o mancha negra	0	
	Presencia de sangre, coágulo adherido, vaso visible o sangrado activo	2	
Puntuación final (después de la endoscopia). Máximo 11			

### Interpretación

Puntuación		0	1	2	3	4	5	6	7	8+
Inicial	Mortalidad (%)	0,2	2,4	5,6	11	24,6	39,6	48,9	50	
	Resangrado (%)	4,9	3,4	5,3	11,2	14,1	24,1	32,9	43,8	48,1
Final	Mortalidad (%)	0	0	0,2	2,9	5,3	10,8	17,3	27	41,1

### Bibliografía

T A Rockall, R F A Logan, H B Devlin, T C Northfield, and the steering committee and members of the National Audit of Acute Upper Gastrointestinal Haemorrhage: Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut 1996; 38: 316-321.